



BOLETÍN SUNWORK EDUCA N°3

DERMATOSIS PROFESIONALES

La dermatitis de contacto ocupacional se define como la inflamación aguda de la piel causada por el contacto directo de la superficie de la piel o de las mucosas con sustancias irritantes o alérgicas, que constituyen agentes de riesgo presentes en el puesto de trabajo, por ejemplo: jabones, productos químicos, detergentes o abrasivos.



**Dermatitis de Contacto
Irritativa**

Es la inflamación cutánea causada por el contacto de la piel con algún agente físico o químico irritante, sin que medie una respuesta de tipo alérgica. Su aparición y presentación clínica depende de múltiples factores internos y externos



**Dermatitis de Contacto
Alérgica**

Es la inflamación cutánea producto de una reacción de hipersensibilidad tipo IV por contacto con un agente o alérgeno presente en el trabajo, al que se ha sensibilizado previamente el trabajador. Dentro de este cuadro, especial mención tiene la Dermatitis de Contacto Protéica, relacionada con la manipulación de proteínas de origen vegetal o animal (látex, harinas, carnes, pescados, verduras, otros), por presentar un mayor riesgo de incapacidad laboral permanente.

PREVENCIÓN con Gestión del Riesgo

- Usar jabones "suaves" no alcalinos. Syndets.
- Evitar el lavado con fricción intensa.
- Secar la piel suavemente.
- Hidratar la piel.
- Si hay lesiones eczematosas se pueden usar cremas con base de óxido de zinc.
- Manejo clínico de las lesiones.
- Disminuir el contacto.
- Uso de EPP: guantes. Hay que plantear el uso de guantes de nitrilo en pacientes con hipersensibilidad al látex.